

► Úgy látszik, hogy végképp hozzá kell szoknunk a szélsőséges, kiszámíthatatlan [időjáráshoz](#). Nyugaton és az ország „közepén” többször esett, a **csapadékot kedvelő kórokozók terjedése felerősödött**. Ilyen pl. a csonthéjasok levéllikasztó betegsége, mely a kajszi, az őszibarack és a mandula esetében is komoly lombhullást okozhat. A blumeriellás levélfoltosság is megjelent, mely a cseresznyénél és a meggyénél okozhat akár teljes lombhullást is. A 10. felhívás készítményei közül választhatnak mindkét gomba ellen.

Az almatermésűek varasodása is fertőz, továbbra is. A 8. felhívásban javasolt felszívódó szerekkel védekezhetnek, a kis gyümölcsök viaszosodásáig. Egy kertész kollégám szerint ez a diónyi nagyságú kis gyümölcsöt jelenti, amikor már lefelé lógnak a gyümölcsök az ágakon. Ekkor újra jöhetnek a réztartalmú gombaölők is, már nem perzselik meg a viaszos bőrű gyümölcsöket.

A Duna-Tisza közén és az Alföldön továbbra is az [aszállyal](#) küzdenek a gazdák. A [Vizes levél időtartam fásszárú növényekre](#) térképen viszont az látható, hogy az alföldi régióban, a harmat miatt hosszan nedvesek voltak a levelek. A gombaspórák a nedves levelek felületén tudnak kicsírázni, fertőzni, így valószínű, hogy ez a rövid ideig tartó vízborítottság itt is elegendő lehetett a fertőzéshez.

A **lisztharmat** valamilyen szinten minden időjárásnál „tartja magát” nálunk. Most is jelen van, sőt a hűvös ellenére az érzékeny almafajtákon tovább terjedt és az őszibarackon is megjelent. Lásd a 6. és a 8. felhívást.

► Az előző években az is bebizonyosodott, hogy a kórokozókhoz képest, a **kártevők (rovarok, atkák)** életét kevésbé zavarja az időjárásunk változása. Tavaly a [kerbarat 2024 18 .pdf](#) felhívásban egy kis összesítő táblázatot is készítettem erről. Most is beindultak, sőt a hideg tavasz ellenére már a vártnál korábban megjelentek pl. a levéltetvek. Pest megyében néhol erős volt a májusi cserebogár kártétele is.

Most a szilvamoly, a keleti gyümölcsmoly és néhol a tarka szőlőmoly is intenzíven rajzik. Tehát a szilvánál, az őszibaracknál, a kajszinál, a szőlőnél érdemes rovarölő szerrel is kiegészíteni a gombaölős permetlevet.

A piretroid hatóanyagok **kontaktak** (érintőlegeseek). Ilyen a deltametrin, a lambda-cihalotrin, stb. Nem piretroid, de kontakt hatásúak a tau-fluvalinátból készültek is. Tehát ezekkel finom permetlécepekkel kell dolgozni, így lehet eltalálni az apró testű rovarokat.

A **felszívódó** acetamiprid elkering a növényben, belülről védi a növényt a rágó, szívó kártevőkkel szemben.

Kiváló a klorantraniliprol mely felszívódó, kontakt, tojásölő hatású és gyomorméregként is hat.

A **gyomorméreg** típusúakból ennie kell a rovaroknak és ezért csak később pusztulnak el. Ilyen hatóanyagok pl. a Bacillus thuringiensis és a Cydia pomonella granulosus virus. A spinozad kontakt és gyomorméreg is. Néhány éve jelent meg az azadirachtin hatóanyag, mely gyomorméreg és a növénybe is felszívódik, de nem áramlik szét abban olyan mértékben, mint a felszívódóak (**mélyhatású készítmény**).

A felsorolt hatóanyagokból készült III. kategóriás növényvédő szerek kereskedelmi neveit megtalálják a [hatóanyag abc 2025.pdf-ben](#). (Pl. az acetamipridből, 25 rovarölőt számoltam össze ebben a felsorolásban. Ezek közül jónéhányat Önök is megvásárolhatnak.)

Az **egyszerű anyagok** közül egyes molyfajok ellen a csalán kivonat, a konyhasó, a répacukor engedélyezett. Rasztik Viktória almamolyra üröm és varádicsteát javasol, ez utóbbit a szőlőmolyokra is ajánlja. Szerinte a bársonyvirág-, a pemete- és kaporkivonat riasztó hatású a két szőlőmolyfajra.

► Almamoly ellen a fák törzsére most lehet kihelyezni a **hernyófogó öveket**. Az első nemzedék lárvái költöznek alájuk, bábozódnak. A szüretig 10-14 naponta cserélik és semmisítsék meg. (Hajdan jogszabályok kötelezték a kertészeket a használatára, almára és körtére, még a cseréjüket is ellenőrizték.) Megvásárolhatóak, de házilag is elkészíthetők. Szárazon kell tartani az öveket, a törzsre tekert kötelet, hullámpapírcsíkot, stb.

► A készítmények sűrű felsorolását nézve, biztos vagyok benne, hogy nemsokára megkapom a kérdéseket: **miért ajánlok ilyen sok permetezést?** Többször leírtam már, hogy ebben csak a gazda tud dönteni. Csak ő ismeri a kertje fekvését, a munkabírását, a fajtái fogékonyságát, ő tudja, hogy hányszor megy ki a fáihoz és, hogy milyen szintű kártételt, fertőzöttséget enged meg a kertjében.

Az ültetvényekben viszont rá vannak kényszerítve az első osztályú termény előállítására. Ők nem hibázhatnak, mert minimális károsítás esetén is már csak az ipari felhasználásra alkalmas besorolást kap a gyümölcs. Ezt gyakran csak ötöde áron tudják eladni. Ma megkérdeztem néhány ilyen „profi” ültetvényben dolgozó kollégát arról, hogy ők hányadik permetezésnél tartanak. Almában általában a hatodik, meggyben, őszibarackban az ötödik-hatodik, kajsziiban a harmadik-negyedik, a szilvában a második fordulón vannak túl. Most készülődnek a következőre, a gombák, a levéltetvek és a molyok miatt, pl. a szilvában.

Úgy gondolom, hogy nekünk nem kell ezt a minőséget megcélózni. A varas héjú almát, a repedt gyümölcsöt is be lehet vinni a konyhába frissfogyasztásra. Egy kis tisztogatás után a „férges” szilvából, kajsziabarackból még jó lekvár és kiváló pálinka főzhető.