

CSONTHÉJASOK, ALMATERMÉSŰEK, SZŐLŐ
AKTUÁLIS FENOLÓGIAI ÉS FERTŐZÉSI HELYZET – ORSZÁGOS KITEKINTÉS

IDŐJÁRÁS

Az elmúlt napok meleg, csapadékos időjárása, valamint a közelgő zivatarok és lehűlés jelentősen növelik a gombás és bakteriális betegségek kockázatát a gyümölcs- és szőlőültetvényekben.

NÖVÉNYEGÉSZSÉGÜGYI KOCKÁZATOK:

Kórokozók, amelyekkel számolni kell:

1. Alma, Körte – Ventúriás varasodás és tűzelhalás:

A jelenlegi időjárás még mindig kedvez a **ventúriás varasodás** terjedésének. A lehullott csapadék (több helyen 15–25 mm) és az előttünk álló párás, meleg periódus optimális a fertőzésre. Javasolt szisztémikus gombaölők, például *difenokonazol* vagy *ciprodinil* alkalmazása a fertőzés megelőzésére. Fagykáros növényeken is védekezni kell, mert a kórokozó a leveleket, vesszőket is fertőzi.

A meleg és csapadékos időjárás ideális a **tűzelhalás** kórokozójának terjedéséhez. A fertőzött részek mielőbbi eltávolítása és növénykondicionáló szerek, valamint réz alkalmazása javasolt.

2. Csonthéjasok – Monília

- A virágzás időszakában a **legnagyobb kockázat**, különösen fagy után, mivel a roncsolt szövetek nyitott fertőzési kapuk.
- Megelőző kezelés után, ha mégis találunk fertőzött ágrészeket, azt mielőbb távolítsuk el. Virágzás után már szabad ismét réztartalmú szerekkel, felszívódó rezet tartalmazó (pl.: Scudo) lombtrágyákkal is folytatni a védekezést!

3. Őszibarack

- **Tafrinás levélfodrosodás:** A betegség veszélye nem múlt el; ahol a védekezés nem volt sikeres, már megjelentek az első tünetek. A fertőzött levelek eltávolítása és megfelelő gombaölő szerek (*tebukonazol*, *rezek*) alkalmazása szükséges.

4. Szilva- Szilvadarázs – Veszélyes időszakban vagyunk!

Poloskaszagú szilvadarázs: A rajzás elindult. A csapdafogások alapján időzített inszekticides permetezésre felszívódó készítmények alkalmazása javasolt. A **szilvadarázs** (elsősorban a **poloskaszagú szilvadarázs**, valamint a **fekete szilvadarázs**) **tömeges rajzása április utolsó harmadában zajlik**, különösen azokban a térségekben, ahol a virágzás közepidőn már túljutottak az ültetvények.

Kártétel jellege:

- A nőstények a **sziromhullás körüli időszakban rakják petéiket csészecimpákra**.

- A lárvák a magházba rágnak → **a gyümölcsök korán lehullanak.**

Védekezés időzítése:

Kulcspon: **szíromhullás után 3–5 nappal**, amikor a lárvák még a gyümölcs belsejében vannak, de a bemosódás hatékony lehet.

Engedélyezett hatóanyag: *acetamiprid*.

KELETI GYÜMÖLCSMOLY – RAJZÁS MEGINDULT!

A keleti gyümölcsmoly **első nemzedékének rajzása több megfigyelési ponton megkezdődött** – különösen kajszi-, őszibarack- és szilvaültetvények környékén. A **meleg nappalok és enyhébb éjszakák** hatására a kártevő gyors fejlődésbe kezdett.

Mire figyeljünk most?

- A nőtények tojásait **elsősorban fiatal hajtásokra és zsenge terméskezdeményekre** rakják.
- A kikelt lárvák **bebábozódásig 2–3 hetet** töltenek a hajtásban, ezalatt **torz hajtásnövekedést, majd hajtáselhalást** okoznak.
- A károsítás **később a termésbe vándorlással folytatódik**, komoly piaci értékcsökkenést okozva.

Csapdázás:

- Feromoncsapdákban **naponta emelkedő egyedszám** figyelhető meg – rajzáscsúcs az időjárástól függően **április végén–május első hetében várható.**

Védekezés (a lárvakelés időpontjára időzítve):

Engedélyezett szerek (nem teljes lista!):

- **Madex Twin (GV)** – biológiai hatású *granulovírus* készítmény, mely a lárvákat fertőzi meg, nagyon szelektív és környezetkímélő.
- **Affirm Opti (emamektin-benzoát)** – idegméregként hat, gyorsan felszívódik a leveleken, kiváló hatékonyságú lárvák ellen.
- **lambda-cihalotrin hatóanyagú szerek** – *piretroid* típusú rovarölőszer, **gyors ölőhatás**, virágzás után alkalmazva, **méhkímélő technológiával.**

Fontos: A keleti gyümölcsmoly évi 3–4 nemzedéke is károsíthat, így **a korai védekezés kritikus a nyári generációk visszaszorításához!**

5. Szőlőültetvények

- **Peronoszpóra és lisztharmat:** A szőlőültetvények hamarosan elérik a peronoszpórára fogékony állapotot. A lisztharmatnak is kedvezőek a feltételek, ezért kombinált védekezés javasolt.
Ajánlott kezelés: *kén+réz, cimoxanil, ditianon.*
- **Tarka szőlómoly:** Figyeljük a csapdázást (feromoncsapda: <https://gazdahely.hu/product-category/feromon-csapdak/> ! Megkezdődött a rajzás; a csapdák egyre több egyedet fognak. A védekezés időzítése kulcsfontosságú. **Ha indokolt:** *klorantraniliprol, spinozad, acetamiprid.*

Ne feledd:

Még ha a fagy komoly kárt is okozott, **a növény egészségi állapotát, hajtásnövekedését és a jövő évi termés megalapozását most is védeni kell!** Ezért a növényvédelmi és kondicionáló kezelések **indokoltak, sőt kiemelten fontosak.**

(RÉZ ajánlás: felszívódó réz: **SCUDO**: 5 literes: 37.500 Ft, 20 literes: 141.000 Ft bruttó partnerünknél, e-mailen megrendelés: bolt@gazdahely.hu, szállítási díjak 5000-10000 Ft között. A SCUDO BIOENGEDÉLYES lombtrágyaként regisztrált készítmény, kitűnő növényvédelmi hatással!)

- Kérdés, kérés esetén ide írhatasz: iroda@novenydoctorkft.com
- Előrejelzési hírlevél előfizetés: <https://novenydoctorkft.hu/online-tudastar/>
- Felhívom figyelmedet, hogy az előrejelzési hírlevél részének, vagy egészének másolása, további felhasználása tilos!
- Szerzői jogi nyilatkozat: <https://novenydoctorkft.hu/jogi-nyilatkozat/>